

DS 2

Durée 3h00

- Les calculatrices sont interdites durant les cours, TD et *a fortiori* durant les DS de mathématiques.
- Si vous pensez avoir découvert une erreur, indiquez-le clairement sur la copie et justifiez les initiatives que vous êtes amenés à prendre.
- Une grande attention sera apportée à la clarté de la rédaction et à la présentations des solutions. (Inscrivez clairement en titre le numéro de l'exercice, vous pouvez aussi encadrer les réponses finales.)
- Vérifiez vos résultats.
- Le résultat d'une question peut être admis et utilisé pour traiter les questions suivantes en le signalant explicitement sur la copie.

- Exercice 1.**
1. Résoudre $e^x - 2e^{-x} \geq -1$ (On pourra faire un changement de variable)
 2. Résoudre $2x - \sqrt{3x+1} > 0$
 3. Résoudre $2x - \sqrt{3x+1} = 1$
 4. En déduire le domaine de définition de la fonction

$$f(x) = \frac{\sqrt{e^x - 2e^{-x} + 1}}{\ln(2x - \sqrt{3x+1})}$$

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}$. En intervertissant les deux sommes, calculer :

$$\sum_{k=0}^n \sum_{l=k}^n \frac{k}{l+1}$$

Relation coefficients-racines Pour les exercices 3 et 4, on pourra utiliser le résultat suivant, appelé "relation coefficients-racines" :

— Soient $(s, p) \in \mathbb{C}^2$ et soient r_1 et r_2 les racines du polynôme : $x^2 - sx + p$. On a alors :

$$r_1 r_2 = p \quad \text{et} \quad r_1 + r_2 = s$$

— Réciproquement, soient r_1 et r_2 deux réels tels que $r_1 r_2 = p$ et $r_1 + r_2 = s$ alors r_1 et r_2 sont les racines du polynôme :

$$x^2 - sx + p.$$

Exercice 3. On propose de résoudre l'équation suivante d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$z^3 - 6z + 4 = 0 \quad (E)$$

1. On considère $z \in \mathbb{C}$ une solution de (E). Soient $(u, v) \in \mathbb{C}^2$ tel que $u + v = z$ et $uv = 2$.
 - (a) Calculer $(u + v)^3$ de deux manières différentes.
 - (b) En déduire que $u^3 + v^3 = -4$.
 - (c) Calculer $u^3 v^3$.
 - (d) Montrer que u^3 et v^3 sont solutions de l'équation $Z^2 + 4Z + 8 = 0$ d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$.
 - (e) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $Z^2 + 4Z + 8 = 0$.
2. On pose $w = -2 + 2i$.
 - (a) Ecrire w sous la forme exponentielle.
 - (b) Résoudre l'équation $Z^3 = w$ d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$ en exprimant les solutions sous forme exponentielle.
 - (c) On pose $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que l'ensemble des solutions de l'équation $Z^3 = w$ est $\{1+i, (1+i)j, (1+i)j^2\}$.
3. En utilisant les questions précédentes, déterminer les valeurs possibles de u et v , puis de z .
4. En déduire les solutions de (E).

Exercice 4. Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$. On considère $A = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

1. Calculer $\frac{1}{\omega}$ en fonction de $\bar{\omega}$
2. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, 7 \rrbracket$ on a

$$\omega^k = \bar{\omega}^{7-k}.$$

3. En déduire que $\bar{A} = B$.
4. Montrer que la partie imaginaire de A est strictement positive. (On pourra montrer que $\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) > 0$.)
5. Montrer par récurrence que $\forall q \neq 1, \forall n \in \mathbb{N} :$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

6. Montrer alors que $\sum_{k=0}^6 \omega^k = 0$. En déduire que $A + B = -1$.
7. Montrer que $AB = 2$.
8. En déduire la valeur exacte de A .

Exercice 5. Pour chaque script, dire ce qu'affiche la console :

1. Script1.py

```
1 a=0
2 n=100
3 for i in range(n):
4     a=a+i
5 print(a/50)
```

2. Script2.py

```
1 a=1
2 n=100
3 for i in range(n):
4     a=a*i
5 print(a)
```

3. Script3.py

```
1 a=0
2 n=100
3 for i in range(0,n,2):
4     a=a+i
5 print(a/50)
```

4. Script4.py

```
1 s=10
2 n=100
3 for i in range(n):
4     s=s+2
5 print(s)
```

5. Script5.py

```
1 a=10
2 for i in range(3):
3     if a%2==0:
4         a=a/2+i
5     else:
6         a=a+3
7 print(a)
```

6. Script6.py (On pourra s'aider de l'exercice 2)

```
1 s=0
2 n=100
3 for k in range(n+1):
4     for l in range(k,n+1):
5         s=s+k/(l+1)
6 print(s)
```